

Переклад українською мовою, автентичність якого підтверджена уповноваженою особою Заявника (Бхаргава С.), інформації про застосування лікарського засобу, затвердженої відповідно до нормативних вимог рекомендованих ВООЗ.

До реєстраційного посвідчення

№ UA/18922/01/01

від 21.09.2021

**Листок-вкладиш з інформацією для пацієнта: ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА
Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат/Ефавіренз/Емтрицитабін
таблетки 300 мг/600 мг/200 мг**

Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат, Ефавіренз, Емтрицитабін

Перш ніж почати приймати цей препарат, уважно прочитайте всю інструкцію.

- Зберігайте цей листок-вкладиш. Можливо, вам доведеться прочитати його ще раз.
- Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, зверніться до свого лікаря, медичного працівника або фармацевта.
- Цей препарат призначений лише для вас. Не передавайте його іншим особам. Це може завдати їм шкоди, навіть якщо ознаки їх хвороби такі ж, як і у вас.

У цьому листку-вкладишу:

1. Що таке Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг і для чого він використовується.
2. Перед застосуванням Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг
3. Як застосовувати Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг
4. Можливі побічні ефекти
5. Як зберігати таблетки Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг
6. Додаткова інформація

**1. ШО ТАКЕ ЕФАВІРЕНЗ/ЕМТРИЦИТАБІН/ТЕНОФОВІРУ ДИЗОПРОКСИЛУ
ФУМАРАТ ТАБЛЕТКИ 600 МГ/200 МГ/300 МГ І ДЛЯ ЧОГО ВІН
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ**

Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг є засобом для лікування інфекції, спричиненої вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) у дорослих та підлітків старше 12 років.

Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг містить активні речовини емтрицитабіну, ефавірензу, та тенофовіру дизопроксилу фумарату. Всі належать до противірусних лікарських засобів. Ефавіренз є нуклеозидним інгібітором зворотної транскриптази. Емтрицитабін є нуклеозидним інгібітором зворотної транскриптази. Тенофовір є нуклеотидним інгібітором зворотної транскриптази. Усі активні речовини пригнічують розмноження вірусу шляхом уповільнення дії ферментів, які ВІЛ використовує для реплікації. Противірусні лікарські засоби, що використовуються при ВІЛ відомі як антиретровірусні препарати.

Цей препарат не лікує ВІЛ-інфекцію. Під час прийому Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/ 200 мг/300 мг все одно можуть розвивати інфекції або інші захворювання, пов'язані з ВІЛ-інфекцією.

2. ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ЕФАВІРЕНЗ/ЕМТРИЦИТАБІН/ТЕНОФОВІРУ ДИЗОПРОКСИЛУ ФУМАРАТ ТАБЛЕТКИ 600 МГ/200 МГ/300 МГ

Не застосовуйте Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг:

- якщо у вас алергія (гіперчутливість) до ефавірензу, емтрицитабіну, тенофовіру дизопроксилу фумарату або будь-якого іншого компонента Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг, перерахованих наприкінці даного листка-вкладиша. Якщо це стосується вас, негайно повідомте свого лікаря і не приймайте Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг.
- якщо ви зараз приймаєте звіробій (*Hypericum perforatum*) (рослинний засіб, що застосовується при депресії та тривожності) або вориконазол (препарат, що застосовується проти грибкових інфекцій).

Будьте особливо обережні приймаючи Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг

Повідомте свого лікаря, якщо у вас була хвороба нирок або якщо аналізи показали проблеми з нирками. Якщо так, то дози тенофовіру та емтрицитабіну рекомендовано буде зменшити. У таких випадках застосовуються інші комбінації тенофовіру, емтрицитабіну та ефавірензу ніж Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг.

Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг можуть впливати на нирки. Перед початком прийому цього лікарського засобу слід зробити аналізи крові, щоб перевірити функціональну здатність нирок. Під час лікування рекомендовано регулярно робити аналіз крові для моніторингу стану нирок.

Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг не рекомендовано застосовувати одночасно з іншими препаратами, які можуть негативно впливати на нирки (див. розділ “Прийом інших лікарських засобів”). Якщо сумісного застосування неможливо уникнути, рекомендований регулярний контроль функціонування нирок.

Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/ 200 мг/300 мг не слід застосовувати дітям віком до 12 років або вагою менше ніж 40 кг.

Перед використанням цього препарату вам слід було повідомити свого лікаря або медичного працівника про наявність в минулому медичних проблем, включаючи алергію, судоми, психічні захворювання або зловживання хімічними речовинами або алкоголем.

Висип на шкірі легкого та середнього ступеня може розвинути у перші два тижні після початку прийому Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг. Зазвичай він проходить протягом 4 тижнів після початку лікування; у разі прогресування важкого шкірного висипу потрібно негайно повідомити про це лікаря або медичного працівника і, за необхідності, припинити прийом Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг.

Після початку прийому Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг, поширеними є побічні реакції з боку центральної нервової системи та розлади психіки починаючи з першого тижня лікування (див.розділ 4 “Можливі побічні реакції”). Ці симптоми зазвичай зникають протягом чотирьох тижнів від початку лікування.

Поговоріть зі своїм лікарем або медичним працівником, якщо у вас в анамнезі є захворювання печінки, включаючи гепатит. ВІЛ-інфіковані пацієнти із захворюваннями печінки, включаючи хронічний гепатит В або С, які отримують антиретровірусні препарати, мають підвищений ризик важких та потенційно летальних ускладнень печінки. Якщо ви інфіковані ВІЛ та вірусом гепатиту В, ваш лікар ретельно підбере найкраще для вас лікування. Якщо у вас в анамнезі є захворювання печінки або хронічний гепатит В, ваш лікар повинен призначити аналіз крові для контролю функції печінки.

Зверніть увагу на можливі симптоми молочнокислого ацидозу (надлишок молочної кислоти в крові) після початку прийому Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг. Можливими ознаками молочнокислого ацидозу лактоацидозу є:

- глибоке, прискорене дихання
- сонливість
- нудота, блювота та біль у шлунку

Цей рідкісний, але серйозний побічний ефект може спричинити збільшення печінки і іноді призвести до летального наслідку. Лактоацидоз зустрічається частіше у жінок та у пацієнтів із надлишковою вагою. Якщо у вас є захворювання печінки, у вас також підвищений ризик розвитку лактоацидозу. Протягом лікування Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг ваш лікар буде уважно стежити за будь-якими ознаками розвитку молочнокислого ацидозу. Якщо ви вважаєте, що у вас спостерігаються ознаки лактоацидозу, негайно зверніться до лікаря.

Будьте обережні, щоб не заразити інших людей. Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг не виключає ризику передачі ВІЛ іншими шляхами такими як статевий контакт або зараження крові. Ви повинні продовжувати застосовувати запобіжні заходи, щоб уникнути цього.

Спостерігайте за інфекціями. Якщо у вас прогресуюча стадія ВІЛ-інфекції (СНІД) і наявна опортуністична інфекція, можуть виникнути симптоми інфекції та запалення або погіршення симптомів цієї інфекції на початку лікування Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг. Ці симптоми можуть свідчити про те, що імунна система вашого організму бореться з інфекцією. Зверніть увагу на ознаки запалення або інфекції, що виникають незабаром після початку прийому Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг. Якщо ви помітили ознаки запалення або інфекції, негайно повідомте про це лікаря або медичного працівника.

У деяких пацієнтів, які приймають комбіновану антиретровірусну терапію, може розвинути патологія кісток, яку називають остеонекроз (загибель кісткової тканини, спричинена порушенням кровопостачання кістки). Тривалість антиретровірусної терапії, застосування кортикостероїдів, наприклад, дексаметазон або преднізолон, вживання алкоголю, сильна імуносупресія та надмірна вага є факторами ризику розвитку цього захворювання. Ознаками остеонекрозу є скутість суглобів, ломота і болі (особливо в тазостегновому, колінному та плечовому) та ускладнення рухів. Якщо ви помітили щось із цих ознак, повідомте вашого лікаря.

Порушення кісткової тканини (що іноді призводить до переломів) може виникати через ураження ниркових клітин (див. розділ 4 "Можливі побічні реакції"). Застосування Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг у підлітків може впливати на ріст кісток. Тому прийом Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг рекомендовано здійснювати лише у разі якщо користь прийому переважає даний ризик.

Вам потрібно буде приймати Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг кожного дня. Цей лікарський засіб допомагає контролювати ваш стан, але він не усуває ВІЛ-інфекцію з організму. Можуть продовжувати розвиватися інші інфекції та інші патології, пов'язані з ВІЛ-інфекцією. Вам слід постійно контактувати зі своїм лікарем або медичним працівником. Не припиняйте приймати ліки, не звернувшись до лікаря або медичного працівника.

Прийом інших лікарських засобів

Повідомте вашого лікаря, фармацевта або медичного працівника, якщо ви приймаєте або нещодавно приймали будь-які інші лікарські засоби, включаючи препарати, що відпускаються без рецепта.

Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг не рекомендовано приймати разом з рослинними препаратами, що містять звіробій (*Hypericum perforatum*, який застосовується проти тривоги та депресії) або вориконазол (застосовується проти грибкових інфекцій).

Крім того, таблетки Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг не слід одночасно застосовувати з:

- астемізол або терфенадин (застосовуються для лікування сінної лихоманки або інших алергій)
- бепридил (застосовується для лікування серцевих захворювань)
- цизаприд (застосовується для лікування печії)
- алкалоїди ріжків (наприклад, ерготамін, дигідроерготамін, ергоновін та метилергоновін) (застосовуються для лікування мігрені та кластерного головного болю)
- пімозид (застосовується для стабілізації психічної діяльності)

Не застосовуйте Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг, якщо ви вже приймаєте інші лікарські засоби, що містять тенофовіру дизопроксилу фумарат, емтрицитабін або ламівудин. Не застосовуйте одночасно Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг та адефовір дипівоксил.

Дуже важливо повідомити свого лікаря або медичного працівника, якщо ви приймаєте інші лікарські засоби, які можуть викликати пошкодження нирок. До них належать:

- аміноглікозиди або ванкомицин (застосовуються для лікування бактеріальної інфекції)
- амфотерицин В або пентамідин (застосовуються для лікування грибкової інфекції)
- фоскарнет, ганцикловір або цидофовір (застосовуються для лікування вірусної інфекції)
- адефовір дипівоксил (застосовуються для лікування вірусного гепатиту В)
- такролімус (застосовуються для лікування для пригнічення імунної системи)
- інтерлейкін-2 (застосовується для лікування раку нирок)

Інші лікарські засоби, що містять диданозин (при ВІЛ-інфекції):

Прийом Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг разом з лікарськими засобами, що містять диданозин, може підвищити рівень диданозину в крові. Повідомлялося про рідкі випадки запалення підшлункової залози та розвиток молочнокислого ацидозу (надлишок молочної кислоти в крові) при сумісному застосуванні диданозину та препаратів, що містять тенофовіру дизопроксилу фумарат, іноді з летальним наслідком. Сумісне застосування тенофовіру з диданозином може зменшити ефект антиретровірусної терапії.

Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг при взаємодії з наступними лікарськими засобами може спричинити виникнення будь-якого побічного ефекту або може вплинути на ефективність будь-якого з препаратів:

- ампренавір, атазанавір, дарунавір, індинавір, лопінавір, маравірок, нелфінавір, ритонавір, саквінавір та типранавір (протівірусні засоби).
- метадон, бупренорфін (застосовують для лікування сильного болю або опіоїдної залежності)
- кларитроміцин, рифабутин або рифампіцин (антибактеріальні/протитуберкульозні засоби)
- аторвастатин, правастатин або симвастатин (гіполіпідемічні препарати, з групи статинів)
- гормональні контрацептиви, такі як протизаплідні таблетки, ін'єкційні контрацептиви або контрацептивний імплантат. Отже, якщо ви приймаєте Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг, рекомендовано застосувати альтернативні методи контрацепції, такі як бар'єрна контрацепція (наприклад, презервативи) (див. розділ "Вагітність та годування груддю")
- ітраконазол, позаконазол (протигрибкові засоби)
- амодіаквін/артесунат, хінін, люмефантрин, галофантрин, артемізиніни (протималярійні засоби)
- карбамазепін, фенітоїн (протисудомні засоби)

- дилтіазем, верапаміл, фелодипін, ніфедипін, нікардипін (блокатор кальцієвих каналів)
- такролімус, циклоспорин, сиролімус (імунодепресанти)
- мідазолам або триазолам (використовуються для того, щоб допомогти вам заснути)
- варфарин (застосовують для профілактики тромбоутворення).

Вагітність та годування груддю

Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксили Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг не рекомендовано застосовувати в першому триместрі вагітності. Негайно повідомте лікаря, якщо ви вагітні або маєте намір завагітніти. Якщо ви вагітні, приймати Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксили Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг рекомендовано лише у разі, якщо ваш лікар визначить що це необхідно. Вади розвитку плода спостерігались в дослідженнях у тварин та у дітей, народжених у жінок, які протягом вагітності приймали ефавіренз; тому слід уникати вагітності жінкам, яким призначено Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксили Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг.

Якщо ви жінка, яка отримує Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксили Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг, вам рекомендовано використовувати надійну форму бар'єрної контрацепції (наприклад, презерватив), а також інші методи контрацепції, включаючи пероральні (таблетки) або інші гормональні контрацептиви (наприклад, імплантат, ін'єкція). Ефавіренз, один з активних компонентів Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксили Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг, може залишатися у крові деякий час після припинення терапії. Тому вам слід продовжувати використовувати протизаплідні засоби, які зазначено вище, протягом 12 тижнів після припинення прийому Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксили Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг.

Якщо ви зацікавлені в грудному вигодовуванні дитини, вам слід обговорити ризики та переваги зі своїм лікарем або медичним працівником.

Керування автотранспортом або іншими механізмами

Під час лікування Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксили Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг повідомлялося про запаморочення, порушення концентрації уваги та сонливість. Якщо ви спостерігаєте ці симптоми, рекомендовано уникати потенційно небезпечних завдань, таких як керування автотранспортом або робота з механізмами.

Важлива інформація про деякі складові компоненти Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксили Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг

Якщо у вас спостерігається непереносимість деяких цукрів, повідомте свого лікаря про це перед прийомом препарату.

3. ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ ЕФАВІРЕНЗ/ЕМТРИЦИТАБІН/ТЕНОФОВІРУ ДИЗОПРОКСИЛУ ФУМАРАТ ТАБЛЕТКИ 600 МГ/200 МГ/300 МГ

Завжди приймайте Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксили Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг точно як сказали вам лікар або медичний працівник. Слід суворо дотримуватись всіх рекомендацій для того, щоб забезпечити повну ефективність лікарського засобу і зменшити ризик розвитку резистентності до лікування. Вам слід проконсультуватися зі своїм лікарем/фармацевтом/медичним представником, якщо ви не впевнені. Завжди приймайте дозу, призначену лікарем або медичним працівником. Не змінюйте дозу, якщо це не рекомендовано лікарем.

Стандартна доза - одна таблетка щодня. Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксили Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг слід приймати натщесерце (рекомендований режим: за 1 годину до або через 2 години після їжі).

Слід проковтнути таблетку Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксили Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг у цілому вигляді з водою.

Рекомендовано приймати Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг сном. Дозування перед сном може покращити переносимість симптомів порушення нервової системи (наприклад, запаморочення, сонливість).

Цей лікарський засіб не призначений для використання дітьми (віком до 12 років або вагою менше 40 кг).

Якщо ваш лікар вирішить припинити застосування одного із компонентів Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг або змінити дозу будь-якого компонента Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг вам можуть призначити емтрицитабін, тенофовір та/або ефавіренз окремо замість комбінованого препарату або інші лікарські засоби для лікування ВІЛ-інфекції.

Якщо ви прийняли більшу дозу Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг, ніж передбачено:

Якщо ви помилково випили більше таблеток Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг, зверніться за порадою до свого лікаря або найближчого відділення невідкладної допомоги. Візьміть із собою упаковку, для того щоб легко описати те, що ви прийняли.

Якщо ви забули прийняти Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг:

Намагайтеся не пропускати дозу. Якщо ви пропустили чергову дозу лікарського засобу і з моменту належного прийому не пройшло 12 годин, слід якомога швидше прийняти препарат, потім дотримуватись звичайного розкладу прийому препарату.

Якщо ви втратили таблетку (відразу після прийому Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг) слід прийняти ще одну таблетку. Не слід чекати, поки настане наступна доза.

Якщо ви припиняєте прийом Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг:

Не припиняйте застосовувати Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг без консультації зі своїм лікарем. Зупинка прийому Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг може серйозно вплинути на вашу реакцію на майбутнє лікування.

Якщо прийом Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг припинено, проконсультуйтеся зі своїм лікарем перед тим, як знову почати приймати Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг.

Ваш лікар може розглянути можливість призначення вам окремих компонентів Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг, якщо виникають медичні проблеми або потрібна корекція дози.

Якщо ваш запас препарату Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг, починає закінчуватись, рекомендовано своєчасно його поповнити. Це дуже важливо, оскільки кількість вірусу може почати збільшуватись, якщо прийом лікарського засобу припинено хоча б на короткий час. Тоді противірусне лікування може стати важчим.

Якщо у вас є і ВІЛ-інфекція, і гепатит В, особливо важливо не припиняти лікування Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг без попередньої консультації з лікарем.

У деяких пацієнтів були зроблені аналізи крові або діагностовано симптоми, які свідчили про те, що перебіг гепатиту погіршився після припинення прийому емтрицитабіну або тенофовіру дизопроксилу фумарат (два з трьох компонентів Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг). В такому випадку лікар може порекомендувати відновити лікування гепатиту В.



Рекомендовано проводити аналіз крові для перевірки роботи печінки протягом 4 місяців після припинення лікування. Припиняти лікування не рекомендовано деяким пацієнтам з прогресуючою патологією печінки або цирозом, оскільки це може призвести до погіршення гепатиту, іноді загрозливого для життя.

Негайно повідомте лікаря про нові або незвичні симптоми, які виникають після припинення лікування, особливо якщо вони пов'язані з гепатитом В.

Якщо у вас є додаткові запитання щодо використання цього продукту, зверніться до свого лікаря, медичного працівника або фармацевта.

4. МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ

Як і всі лікарські засоби Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг може спричинити розвиток побічних реакцій, хоча вони виникають не у всіх пацієнтів.

Повідомте лікаря у разі виникнення будь якої побічної реакції:

Дуже часті побічні реакції

(зустрічаються з частотою більше ніж у 1 пацієнта з 10)

- запаморочення, головний біль, діарея, нудота, блювота
- висипання (включаючи червоні плями або плями, іноді з пухирями та набряком шкіри), які можуть бути алергічними реакціями
- слабкість

Тести також можуть показати:

- зниження рівня фосфатів у крові
- підвищений рівень креатинінази в крові, що може спричинити біль у м'язах та слабкість

Часті побічні реакції

(зустрічаються з частотою від 1 до 10 пацієнтів із 100)

- зміни кольору шкіри, включаючи потемніння шкіри в місцях, часто починаються на руках і підшвах
- біль, біль у шлунку
- труднощі зі сном, ненормальні сни, труднощі з концентрацією уваги, сонливість
- почуття занепокоєння або депресії
- проблеми з травленням, що спричиняє дискомфорт після їжі, відчуття роздутості, вітру (метеоризм)
- втрата апетиту
- втома
- свербіж
- порушення координації та рівноваги
- алергічні реакції

Тести також можуть показати:

- низький рівень лейкоцитів (знижений рівень лейкоцитів може зробити вас більш схильними до зараження)
- підвищений вміст жирних кислот (тригліцеридів), рівня білірубину або цукру в крові
- проблеми з печінкою та підшлунковою залозою

Нечасті побічні реакції

(Це може торкнутися від 1 до 10 користувачів з 1000)

- агресивна поведінка, суїцидальні думки, нав'язливі думки, паранойя, нездатність чітко мислити, зміни настрою, порушення зору та слуху у формі викривленої реальності (галюцинації), спроби самогубства, зміна особистості (психоз)
- порушення пам'яті, судоми (конвульсії), незв'язна мова, тремор (тремтіння)
- помутніння зору

- порушення відчуття рівноваги (вертиго), свисту, дзвону або іншого постійного шуму у вухах
 - сухість у роті
 - алергічна реакція (гіперчутливість), яка може викликати важкі шкірні реакції (синдром Стівенса-Джонсона, мультиформна еритема (див.розділ 2 «Перед застосуванням Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг»)
 - припливи
 - жовтий стан шкіри або очей, свербіж або біль у животі (шлунку), спричинені запаленням печінки
 - біль у животі (шлунку), спричинена запаленням підшлункової залози
 - підвищення апетиту
 - збільшення грудей у чоловіків
 - анемія (низький рівень еритроцитів)
 - зниження статевого потягу
 - озноб
 - рабдоміоліз, м'язовий біль або слабкість
 - набряк обличчя, губ, язика або горла
- Тести також можуть показати:*
- зменшення вмісту калію в крові
 - збільшення рівня креатиніну в крові
 - протеїнурія

Рідкісні побічні реакції

(зустрічаються з частотою від 1 до 10 пацієнтів з 10000)

— Молочнокислий ацидоз (надлишок молочної кислоти в крові), серйозний побічний ефект, який може призвести до летального наслідку. Наступні симптоми можуть бути ознаками лактоацидозу:

- глибоке прискорене дихання
- сонливість
- нудота, блювота та біль у шлунку

Якщо ви вважаєте, що у вас може бути молочнокислий ацидоз, негайно зверніться до лікаря.

— біль у спині, спричинена проблемами з нирками, включаючи ниркову недостатність. Ваш лікар може призначити аналізи крові, щоб перевірити, чи працюють ваші нирки належним чином.

- жировий гепатоз
- печінкова недостатність, в деяких випадках призводить до смерті або трансплантації печінки. Більшість випадків траплялося у пацієнтів, які вже мали захворювання печінки, але було декілька повідомлень про пацієнтів без будь-яких захворювань печінки.
- висип та зуд шкіри, спричинені реакцією на сонячне світло
- ураження нирок, з посиленням діурезом і відчуттям спраги
- остеопороз (що супроводжується болем у кістках, іноді переломами)

Тести також можуть показати:

- пошкодження клітин каналців нирок

Патологія м'язів, розм'якшення кісток (з болями у кістках, переломами), м'язові болі, м'язова слабкість, зниження вмісту калію або фосфату в крові може відбуватися через пошкодження клітин каналців нирок.

Інші можливі негативні ефекти

Побічні ефекти з боку печінки: Якщо ви також інфіковані вірусом гепатиту В, у вас може спостерігатися погіршення ознак гепатиту після припинення прийому лікування (див. розділ 3 «Як застосовувати Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру дизопроксилу фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг»).



Комбінована антиретровірусна терапія (така як Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру дизопрокси́лу фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг) може змінити форму вашого тіла, порушуючи розподіл жирової тканини в організмі. Ви можете втратити жировий шар на ногах, руках і обличчі; набрати жирову тканину навколо живота і внутрішніх органів, що може проявлятися збільшенням грудей, відкладенням жиру в ділянці шиї («горб буйвола»). Причина і довгострокові наслідки цих змін поки не відомі. Комбінована антиретровірусна терапія також може спричинити підвищення рівня ліпідів в крові (гіперліпідемія) та стійкість до інсуліну. Ваш лікар призначить лабораторні аналізи для виявлення таких змін. Коли Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру дизопрокси́лу фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг призначають підліткам, може спостерігатися порушення росту кісток (див. вище, «Будьте особливо обережні приймаючи Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру дизопрокси́лу фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг»).

Якщо будь-яка з побічних реакцій стає серйозною або якщо ви помічаєте будь-які інші побічні ефекти, не зазначені у цій брошурі, повідомте про це своєму лікарю або медичному працівнику.

5. ЯК ЗБЕРІГАТИ ЕФАВІРЕНЗ/ЕМТРИЦИТАБІН/ТЕНОФОВІРУ ДИЗОПРОКСИ́ЛУ ФУМАРАТ ТАБЛЕТКИ 600 МГ/200 МГ/300 МГ

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Не використовувати Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру дизопрокси́лу фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг після закінчення терміну придатності, який вказаний на флаконі та коробці після {EXP}. Термін придатності відноситься до останнього дня цього місяця.

Зберігати при температурі не вище 30 °C. Зберігати в оригінальній упаковці.

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Що містить Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру дизопрокси́лу фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг

Діючі речовини - 600 мг ефавірензу, 200 мг емтрицитабіну, 300 мг тенофовіру дизопрокси́лу фумарату (еквівалентно тенофовіру дизопрокси́лу 245 мг або тенофовіру 136 мг)

Ядро таблетки:

Натрію кроскармелоза; гідроксипропілцелюлоза; лактоза, моногідрат; магнію стеарат, целюлоза мікрокристалічна; натрію лаурилсульфат.

Оболонка (Opadry II 85F94172 Рожевий): заліза оксид чорний, заліза оксид червоний, поліетиленгліколь, спирт полівініловий частково гідролізований, тальк, титану діоксид.

Як виглядає Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру дизопрокси́лу фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг та вміст упаковки

Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру дизопрокси́лу фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг рожевого кольору, у формі каплет, вкриті плівковою оболонкою, таблетки з тисненням «M171» з одного боку та гладкі з іншого боку, доступні:

Білий непрозорий круглий флакон з ПВШ, оснащений білою непрозорою поліпропіленовою кришкою, що закривається гвинтовою кришкою, герметично закритий алюмінієм і містить мікрофільтр 2 г (CAN TRISORB(2G) або пакетик з мікрофільтром 2 г як осушувач. Розміри упаковки: 28 та 30 таблеток.

Синій непрозорий, круглий флакон з ПВШ, оснащений синьою непрозорою поліпропіленовою кришкою, що закривається гвинтовою кришкою, герметично закритий алюмінієм і містить мікрофільтр 2 г (CAN TRISORB(2G) або пакетик з мікрофільтром 2 г як осушувач. Розміри упаковки: 28 та 30 таблеток.

Таблетки не слід ділити.

ПОСТАЧАЛЬНИК

Майлан Лабораторіс Лімітед
Плот № 564/A/22, Род № 92,
Джубілі Хілс Хайдерабад - 500096, Телангана,
Індія.

Email: imtiyaz.basade@mylan.in

ВИРОБНИК

Майлан Лабораторіс Лімітед
F-4, F-12, Малегаон М.І.Д.С, Сіннар,
Нашік – 422113, Махараштра стейт, Індія

Майлан Лабораторіс Лімітед

Н-12 та Н-13, МІДС, Уолуж
Аурангабад - 431136, Махараштра стейт, Індія

Майлан Лабораторіс Лімітед

Плот №11,12 та 13 Індор Спешел Економік Зон,
Фаза – II, Сектор – III, Пітампур – 454775,
Діст-Дхар, М.П., Індія

За будь-якою інформацією щодо цього лікарського засобу звертайтеся до постачальника.

Дана брошура востаннє була затверджена в червні 2011 року. Розділ 6 оновлений в березні 2017 року.

Детальна інформація про цей лікарський засіб доступна на веб-сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ): <http://www.who.int/prequal/>.

Зверніться до веб-сайту ВООЗ-PQ, щоб дізнатися про показники ефективності препарату Ефавіренз/Емтрицитабін/Тенофовіру дизопроксилу фумарат таблетки 600 мг/200 мг/300 мг (HA444)



9698

ВІД *22.11.2021*

à partir des données cliniques, contre-indiqué à l'accès, pendant 12 semaines après avoir été de poids. Examen
contrôle/formation de données de 100 mg/200 mg/200 mg comprimés.

Si vous souhaitez savoir votre enfant, vous devez discuter des risques et bénéfices éventuels avec votre médecin ou pharmacien
de santé.

Coordonnées de répression et utilisation de médicaments

[illegible]

2. COMMENT PRÉVENIR L'AVANCEMENT/RETARDATION/FAUSSEMENT DE TENDUOUS D'IMPULSIONS 800 810 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000 12100 12200 12300 12400 12500 12600 12700 12800 12900 13000 13100 13200 13300 13400 13500 13600 13700 13800 13900 14000 14100 14200 14300 14400 14500 14600 14700 14800 14900 15000 15100 15200 15300 15400 15500 15600 15700 15800 15900 16000 16100 16200 16300 16400 16500 16600 16700 16800 16900 17000 17100 17200 17300 17400 17500 17600 17700 17800 17900 18000 18100 18200 18300 18400 18500 18600 18700 18800 18900 19000 19100 19200 19300 19400 19500 19600 19700 19800 19900 20000 20100 20200 20300 20400 20500 20600 20700 20800 20900 21000 21100 21200 21300 21400 21500 21600 21700 21800 21900 22000 22100 22200 22300 22400 22500 22600 22700 22800 22900 23000 23100 23200 23300 23400 23500 23600 23700 23800 23900 24000 24100 24200 24300 24400 24500 24600 24700 24800 24900 25000 25100 25200 25300 25400 25500 25600 25700 25800 25900 26000 26100 26200 26300 26400 26500 26600 26700 26800 26900 27000 27100 27200 27300 27400 27500 27600 27700 27800 27900 28000 28100 28200 28300 28400 28500 28600 28700 28800 28900 29000 29100 29200 29300 29400 29500 29600 29700 29800 29900 30000 30100 30200 30300 30400 30500 30600 30700 30800 30900 31000 31100 31200 31300 31400 31500 31600 31700 31800 31900 32000 32100 32200 32300 32400 32500 32600 32700 32800 32900 33000 33100 33200 33300 33400 33500 33600 33700 33800 33900 34000 34100 34200 34300 34400 34500 34600 34700 34800 34900 35000 35100 35200 35300 35400 35500 35600 35700 35800 35900 36000 36100 36200 36300 36400 36500 36600 36700 36800 36900 37000 37100 37200 37300 37400 37500 37600 37700 37800 37900 38000 38100 38200 38300 38400 38500 38600 38700 38800 38900 39000 39100 39200 39300 39400 39500 39600 39700 39800 39900 40000 40100 40200 40300 40400 40500 40600 40700 40800 40900 41000 41100 41200 41300 41400 41500 41600 41700 41800 41900 42000 42100 42200 42300 42400 42500 42600 42700 42800 42900 43000 43100 43200 43300 43400 43500 43600 43700 43800 43900 44000 44100 44200 44300 44400 44500 44600 44700 44800 44900 45000 45100 45200 45300 45400 45500 45600 45700 45800 45900 46000 46100 46200 46300 46400 46500 46600 46700 46800 46900 47000 47100 47200 47300 47400 47500 47600 47700 47800 47900 48000 48100 48200 48300 48400 48500 48600 48700 48800 48900 49000 49100 49200 49300 49400 49500 49600 49700 49800 49900 50000 50100 50200 50300 50400 50500 50600 50700 50800 50900 51000 51100 51200 51300 51400 51500 51600 51700 51800 51900 52000 52100 52200 52300 52400 52500 52600 52700 52800 52900 53000 53100 53200 53300 53400 53500 53600 53700 53800 53900 54000 54100 54200 54300 54400 54500 54600 54700 54800 54900 55000 55100 55200 55300 55400 55500 55600 55700 55800 55900 56000 56100 56200 56300 56400 56500 56600 56700 56800 56900 57000 57100 57200 57300 57400 57500 57600 57700 57800 57900 58000 58100 58200 58300 58400 58500 58600 58700 58800 58900 59000 59100 59200 59300 59400 59500 59600 59700 59800 59900 60000 60100 60200 60300 60400 60500 60600 60700 60800 60900 61000 61100 61200 61300 61400 61500 61600 61700 61800 61900 62000 62100 62200 62300 62400 62500 62600 62700 62800 62900 63000 63100 63200 63300 63400 63500 63600 63700 63800 63900 64000 64100 64200 64300 64400 64500 64600 64700 64800 64900 65000 65100 65200 65300 65400 65500 65600 65700 65800 65900 66000 66100 66200 66300 66400 66500 66600 66700 66800 66900 67000 67100 67200 67300 67400 67500 67600 67700 67800 67900 68000 68100 68200 68300 68400 68500 68600 68700 68800 68900 69000 69100 69200 69300 69400 6

Prévenir l'émission d'effluents gazeux : les gaz d'échappement des moteurs diesel doivent être traités par un catalyseur avant d'être évacués dans l'atmosphère. Les moteurs diesel doivent être équipés d'un catalyseur à trois voies (oxydation du monoxyde de carbone, oxydation des hydrocarbures imbrûlés et réduction des oxydes d'azote) et d'un filtre à particules (FAP) pour éliminer les particules fines. Les moteurs diesel doivent également être équipés d'un système de recyclage de l'eau de lavage des injecteurs pour éviter les fuites de carburant.

Se metabolisme se dat pe o perioadă de 12 ani de la naștere de 40 ani.

Il vous sera pris plus d'Uninsure/ventilateur/ventilateur de l'apnée (dispositif 000 mg/200 mg) que vous ne pouvez pas vous en passer.

Si vous ne pouvez pas vous en passer d'Uninsure/ventilateur/ventilateur de l'apnée (dispositif 000 mg/200 mg) que vous ne pouvez pas vous en passer, vous pouvez en avoir besoin pour vous en passer de l'apnée (dispositif 000 mg/200 mg) que vous ne pouvez pas vous en passer.

Il vous est indiqué de prendre 1 comprimé (contenant 500 mg d'ibuprofène et 500 mg d'aspirine) 4 fois par jour, soit 2000 mg de comprimés :
 Écrivez de 1 à 4 l'heure à laquelle vous devez prendre le comprimé une fois, pendant les jours possibles. Généralement, le vous devez
 attendre de 12 heures de la prise précédente, contre-indiqué pour prendre le dose suivante si l'heure subséquente.

Si vous ne pouvez le comprimé (après avoir pris 1 comprimé) à l'heure subséquente, ne prenez pas le comprimé suivant. Prenez le comprimé suivant
 à l'heure suivante, mais devez prendre un comprimé à l'heure suivante, l'après de la prise suivante.

Si vous souhaitez de grandes économies, achetez les comprimés de lévodopa dispersés 600 mg/200 mg/300 mg en comprimés : l'excipient peut être sucré. Choisissez l'émulsion buccale de lévodopa dispersé 600 mg/200 mg/300 mg en comprimés sans sucre pour éviter toute indigestion.

Si vous avez arrêté de prendre l'un des médicaments suivants de l'Annexe B, consultez votre médecin avant de commencer à prendre l'un des médicaments suivants de l'Annexe A.

[illegible]

Si vous avez besoin de prendre d'autres médicaments, consultez votre pharmacien. Les médicaments suivants peuvent interagir avec le traitement par l'Alcaloïde R.

Des analyses de sang pourraient être effectuées afin de vérifier le fonctionnement de votre foie pendant 4 mois après l'arrêt du traitement.

Chez certains patients présentant une cirrhose ou une maladie du foie à un stade avancé, l'arrêt du traitement n'est pas recommandé car cela pourrait provoquer une aggravation de l'hépatite qui pourrait entraîner une issue fatale.

Informez immédiatement votre médecin de tout symptôme supplémentaire, tout effet indésirable ou tout effet du traitement, ou tout autre problème.

4. **QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS**
Comme tout les médicaments, l'usage de cet médicament peut entraîner des effets indésirables. Les effets indésirables les plus fréquents sont les suivants :

— **Identification** : nom de l'effort, date, lieu de venue (ville), intervenants.

- Les données peuvent également servir :
 - détermination des lieux de phytoséquestration
 - détermination des types de traites légers dans le sang, pour les évaluer des données et une table de données

- modifications de la couleur de la peau, et surtout apparition de taches sombres sur la peau (dûes à une carence en vitamines)
- douleurs, sautes d'humeur
- difficultés à dormir, stress, anxiété, difficultés à se concentrer, constipation

- monde en dépression
- problèmes diversifiés entraînant une gêne pour les repas, ballonnements, gaz (flatulences)
- perte d'appétit
- fatigue
- diarrhées
- troubles de la coordination et de l'équilibre

- stimulation du système nerveux autonome
- réactions allergiques

Les neurones peuvent également modifier :

- stimulation du système de glucose blanc (une réduction du système de glucose blanc peut vous rendre plus vulnérable au diabète)
- augmentation des taux d'urée puis (hypotension), de libération de sucre dans le sang

Effets indésirables par fréquence
(Prévalence toutes les 100 personnes) (sur 1 000)

- déviation, confusion, ou **algébriques** (convulsions), parosies brèves, brulures
- **stun** (floc)
- **convulsions** du tonus ou du clonus (surtout, **différent**, **asymétriques** ou autre **bruit** paroxysmal des **muscles**)
- **brûlure** (surtout)
- **réaction allergique** (**hypersensibilité**) pouvant entraîner des **réactions cutanées** (surtout **syndrome de Sjaerger-Johnson**, **erythème polymorphe**, voir **tableau 2**)

- lésion de l'utérus
- infection grave de la peau ou des yeux, dermatose ou plaques dans l'abdomen (eczéma) dues à une infection du foie
- douleur dans l'abdomen (eczéma) dues à une infection du pancréas
- dépression de l'appel
- augmentation de la sécrétion des sécrétions chez les hommes
- sécrétion (forte sécrétion de sécrétion)

- dissolution du gène *serpin*
- *trypsin*
- activation des muscles, dactyles ou latitices musculaires
- gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge

Les analyses peuvent également servir :

- augmentation du bruit au plateau initial du sang
- augmentation du bruit de turbulence dans le sang
- présence de protromboses dans les artères

Effets indésirables rares

(Peuvent toucher 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)

- Lésions hépatiques (surtout d'origine hépatique dans le sang) et au effet indésirable grave qui peut engendrer la mort subite. Les effets

- respiration profonde et rapide
- fatigue
- états de stress (anxiété), vertiges, états d'effort

[illegible]

- Informations relatives, sources abondantes et sensation de satiété
- Régulation des ou (accompagnement de douleurs occasionnelles et conduisant parfois à des sucreries)

Les médicaments peuvent également agir sur :

- Sécrétion des salivaires salivaires sécrétion

L'absence des médicaments, la régulation osseuse (accompagnement de douleurs occasionnelles et conduisant parfois à des sucreries)

Autres effets indésirables observés : (à compléter si vous êtes également infecté) par le virus de l'hépatite B, une aggravation de l'hépatite parentale se produisant après l'arrêt du traitement (voir rubrique 3). - Consommez toujours *Effetvaccinacovid19* à l'heure et au lieu indiqués sur la notice.

La polyphagie antiparasitaire telle qu'elle est caractérisée, conduit à une forte consommation de nourriture (jusqu'à 100 mg/200 mg/200 mg) comparée aux autres espèces de poissons. Les poissons de cette espèce sont donc très intéressants pour l'aquariophilie car ils peuvent être utilisés pour contrôler les populations de parasites. Les poissons de cette espèce sont très intéressants pour l'aquariophilie car ils peuvent être utilisés pour contrôler les populations de parasites. Les poissons de cette espèce sont très intéressants pour l'aquariophilie car ils peuvent être utilisés pour contrôler les populations de parasites.

Si l'effet indésirable est dû à l'usage prolongé et/ou à une surdosage à l'origine, vous devez arrêter de prendre le médicament et consulter votre médecin.

- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- L'indien *gugu* (chlorhydrate d'émétine) est un médicament de référence désigné 500 mg/250 mg/200 mg comprimés après la date de prescription antérieure sur le Baccus et l'emballage après (EPV). La date de prescription fait référence au dernier jour de ce mois.

Les substances actives sont l'66-vinore (600 mg), l'indométhacine (200 mg) et le benidol de benidol dispersé (300 mg) (300 mg).

(continued)

0

11

91

